

Исследование однородных пространств с совершенной алгеброй голономии

Н. П. Можей, e-mail: mozheynatalya@mail.ru¹

¹ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Аннотация. *Объектом исследования являются алгебры голономии инвариантных связностей на однородных пространствах. Определены основные понятия: инвариантная аффинная связность, тензор кручения, тензор кривизны, алгебра голономии. Целью работы является описание совершенных алгебр голономии аффинных связностей на однородных пространствах. Проведено локальное описание трехмерных однородных пространств, допускающих инвариантную связность с совершенной алгеброй голономии, что эквивалентно описанию соответствующих эффективных пар алгебр Ли. Описаны тензоры кривизны и кручения и сами совершенные алгебры голономии указанных связностей. Методика исследований ориентирована на использование средств компьютерной алгебры, теории групп и алгебр Ли, а также теории однородных пространств.*

Ключевые слова: *алгебра голономии, однородное пространство, аффинная связность, тензор кривизны, тензор кручения.*

Введение

Многообразие обладает совершенной группой голономии, если вся алгебра голономии порождается только операторами кривизны. Связь совершенной группы голономии лоренцевых пространств с рекуррентными тензорными полями рассматривается, например, в [1]. С описанием алгебр голономии тривиальных связностей на однородных пространствах с неразрешимыми группами преобразований можно ознакомиться в [2], целью же данной статьи является определение, при каких условиях алгебра голономии является совершенной. Работа является продолжением исследований автора в области дифференциальной геометрии с использованием пакетов аналитических вычислений.

Основная часть

Пусть m – дифференцируемое многообразие, на котором транзитивно действует группа \bar{G} , $G = \bar{G}_x$ – стабилизатор произвольной

точки $x \in M$. Пусть \bar{g} – алгебра Ли группы Ли \bar{G} , а g – подалгебра, соответствующая подгруппе G . Там, где это не будет вызывать разночтения, будем отождествлять подпространство, дополнительное к g в \bar{g} , и факторпространство $m = \bar{g}/g$. Аффинной связностью на паре (\bar{g}, g) называется такое отображение $\Lambda : \bar{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(m)$, что его ограничение на g есть изотропное представление подалгебры, а все отображение является g -инвариантным. Тензор кручения $T \in \text{Inv}T_2^{-1}(m)$ и тензор кривизны $R \in \text{Inv}T_3^{-1}(m)$ для всех $x, y \in \bar{g}$ имеют вид:

$$T(x_m, y_m) = \Lambda(x)y_m - \Lambda(y)x_m - x, y_m,$$

$$R(x_m, y_m) = \Lambda(x)\Lambda(y) - \Lambda([x, y]).$$

Одной из важнейших характеристик связности является группа голономии. Переформулируем теорему Вана [3] об алгебре голономии: алгебра Ли \mathfrak{h}^* группы голономии инвариантной связности $\Lambda : \bar{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$ на паре (\bar{g}, g) – это подалгебра алгебры $\mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$ вида $V + [\Lambda(\bar{g}), V] + [\Lambda(\bar{g}), [\Lambda(\bar{g}), V]] + \dots$, где V – подпространство, порожденное множеством $\{[\Lambda(x), \Lambda(y)] - \Lambda([x, y]) \mid x, y \in \bar{g}\}$. Положим $\alpha_{\bar{g}}$ равной подалгебре $\mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$, порожденной $\{\Lambda(x); x \in \bar{g}\}$.

Многообразие обладает совершенной группой голономии, если алгебра голономии порождается лишь операторами кривизны.

Будем описывать пару (\bar{g}, g) при помощи таблицы умножения алгебры Ли \bar{g} в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$, $n = \dim \bar{g}$, причем $\{e_1, \dots, e_{n-3}\}$ – базис g , а $\{u_1 = e_{n-2}, u_2 = e_{n-1}, u_3 = e_n\}$ – базис m . Для нумерации подалгебр используем запись $d.n$, а для нумерации пар – запись $d.n.m$, здесь d – размерность подалгебры, n – номер подалгебры в $\mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$, а m – номер пары (\bar{g}, g) . В дальнейшем, если на параметры, появляющиеся в процессе классификации, накладываются дополнительные условия, то они записываются в таблице умножения, в противном случае предполагается, что параметры пробегают все \mathbb{R} . Будем выписывать аффинную связность через $\Lambda(u_1), \Lambda(u_2), \Lambda(u_3)$, а тензор кривизны R – через $R(u_1, u_2), R(u_1, u_3), R(u_2, u_3)$. Все указанные далее связности являются связностями без кручения. Также далее везде по умолчанию будет предполагаться, что алгебра голономии является ненулевой.

Проведение вычислений для нахождения совершенных алгебр голономии наиболее эффективно с использованием систем компьютерной математики, в частности, в системы Maple (пакеты DifferentialGeometry, GroupActions, LieAlgebras, Tensor и другие).

Рассмотрим, например, случай 4.13, где

$$\mathfrak{g} = \left\{ \begin{pmatrix} x & z & u \\ 0 & \lambda y & y \\ 0 & -y & \lambda y \end{pmatrix} \middle| x, y, z, u \in \mathbb{R}, \lambda \geq 0 \right\},$$

базис подалгебры выбираем, придав одной и латинских переменных значение 1, а остальным 0, нумерация базисных векторов соответствует алфавиту. Нильпотентная подалгебра \mathfrak{h} порождена векторами e_1 и e_2 .

Пусть $q: \mathfrak{g} \rightarrow L(\mathfrak{m}, \mathfrak{g})$ – линейное отображение, такое, что

$q([x, y]) = x \cdot q(y) - y \cdot q(x)$, $x, y \in \mathfrak{g}$. Рассмотрим комплексный модуль

$(\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}, \mathfrak{m}^{\mathbb{C}})$. Положим $\tilde{e}_i = e_i \otimes 1$, $1 \leq i \leq 4$, $\tilde{u}_j = u_j \otimes 1$, $1 \leq j \leq 3$. Тогда

$\tilde{E} = \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3, \tilde{e}_4\}$ – базис $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$. Векторное пространство $\mathfrak{m}^{\mathbb{C}}$ может быть

отождествлено с \mathbb{C}^3 , $\{\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \tilde{u}_3\}$ – стандартный базис $\mathfrak{m}^{\mathbb{C}}$. Поскольку

$$\mathfrak{g}^{(0,0)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_4, \quad \mathfrak{g}^{(1,-\lambda+i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3), \quad \mathfrak{g}^{(1,-\lambda-i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3),$$

$$(\mathfrak{m}^{\mathbb{C}})^{(0,-\lambda+i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3), \quad (\mathfrak{m}^{\mathbb{C}})^{(0,-\lambda-i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3), \quad (\mathfrak{m}^{\mathbb{C}})^{(1,0)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}u_1,$$

$$\text{имеем} \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_1)(\tilde{u}_1) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_1) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_1)(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3) = 0,$$

$$q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_1)(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3) = 0,$$

$$q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_1) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_4)(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3) = 0,$$

$$q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3)(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_4)(\tilde{u}_1) = 0, \quad q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_4)(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3) = 0. \quad \text{Поэтому}$$

$$q^{\mathbb{C}}(\tilde{e}_i)(u_j) = 0, \quad 1 \leq i \leq 4, \quad 1 \leq j \leq 3. \quad \text{Имеем} \quad \overline{\mathfrak{g}}^{(0,0)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_4,$$

$$\overline{\mathfrak{g}}^{(1,-\lambda+i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3), \quad \overline{\mathfrak{g}}^{(1,-\lambda-i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3), \quad \overline{\mathfrak{g}}^{(0,-\lambda+i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3),$$

$$\overline{\mathfrak{g}}^{(1,0)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}u_1, \quad \overline{\mathfrak{g}}^{(0,-\lambda-i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(\tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3), \quad \text{тогда} \quad [\tilde{u}_1, \tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3] \in \overline{\mathfrak{g}}^{(1,\lambda+i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}),$$

$$[\tilde{u}_1, \tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3] \in \overline{\mathfrak{g}}^{(1,\lambda-i)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}), \quad [\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3, \tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3] \in \overline{\mathfrak{g}}^{(0,2\lambda)}(\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}). \quad \text{Если } \lambda \neq 0, \text{ то}$$

пара $(\overline{\mathfrak{g}}, \mathfrak{g})$ тривиальна (т.е. существует коммутативный идеал \mathfrak{m} алгебры Ли $\overline{\mathfrak{g}}$, такой, что $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{m} = \overline{\mathfrak{g}}$). Связность на этой паре, тензоры

кривизны и кручения, алгебра голономии нулевые. Если $\lambda = 0$, то

$$[\tilde{u}_1, \tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3] = [\tilde{u}_1, \tilde{u}_2] + i[\tilde{u}_1, \tilde{u}_3] \in \mathbb{C}(\tilde{e}_2 + i\tilde{e}_3), \quad [\tilde{u}_1, \tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3] = [\tilde{u}_1, \tilde{u}_2] -$$

$$i[\tilde{u}_1, \tilde{u}_3] \in \mathbb{C}(\tilde{e}_2 - i\tilde{e}_3), \quad [\tilde{u}_2 + i\tilde{u}_3, \tilde{u}_2 - i\tilde{u}_3] = -2i[\tilde{u}_2, \tilde{u}_3] \in \mathbb{C}e_1 + \mathbb{C}e_4. \quad \text{Тогда}$$

$$[u_1, u_2] = a_2e_2 + a_3e_3, \quad [u_1, u_3] = b_2e_2 + b_3e_3, \quad [u_2, u_3] = c_1e_1 + c_4e_4. \quad \text{В силу}$$

тождества Якоби получаем, что $[u_1, u_2] = a_2 e_2$, $[u_1, u_3] = a_2 e_3$, $[u_2, u_3] = a_2 e_4$. При $a_2 = 0$ пара $(\bar{\mathfrak{g}}, \mathfrak{g})$ тривиальна (связность на ней, тензоры кривизны и кручения, алгебра голономии нулевые). При $a_2 > 0$ эквивалентность пар $(\bar{\mathfrak{g}}, \mathfrak{g})$ и 4.13.2 устанавливается посредством $\pi: \bar{\mathfrak{g}}_2 \rightarrow \bar{\mathfrak{g}}$, $\pi(e_i) = e_i$, $i = 1, 4$, $\pi(u_j) = a_2^{-1/2} u_j$, $j = 1, 3$, где

4.13.2	e_1	e_2	e_3	e_4	u_1	u_2	u_3
e_1	0	e_2	e_3	0	u_1	0	0
e_2	$-e_2$	0	0	e_3	0	u_1	0
e_3	$-e_3$	0	0	$-e_2$	0	0	u_1
e_4	0	$-e_3$	e_2	0	0	$-u_3$	u_2
u_1	$-u_1$	0	0	0	0	e_2	e_3
u_2	0	$-u_1$	0	u_3	$-e_2$	0	e_4
u_3	0	0	$-u_1$	$-u_2$	$-e_3$	$-e_4$	0

Связность на этой паре и ее тензор кручения нулевые, тензор кривизны имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Алгебра, порожденная множеством $R(u_i, u_j)$, т. е. $V = \{[\Lambda(x), \Lambda(y)] - \Lambda([x, y]) \mid x, y \in \bar{\mathfrak{g}}\}$, совпадает с алгеброй голономии (таким образом, группа голономии совершенна) и имеет вид

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & p_1 & p_2 \\ 0 & 0 & -p_3 \\ 0 & p_3 & 0 \end{pmatrix}, p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

При $a_2 < 0$ пара $(\bar{\mathfrak{g}}, \mathfrak{g})$ при помощи $\pi: \bar{\mathfrak{g}}_3 \rightarrow \bar{\mathfrak{g}}$, $\pi(e_i) = e_i$, $\pi(u_j) = (-a_2)^{-1/2} u_j$, $i = 1, 4$, $j = 1, 3$ эквивалентна паре 4.13.3 (поскольку $\dim D\bar{\mathfrak{g}}_1 \neq \dim D\bar{\mathfrak{g}}_2$ и $\dim D\bar{\mathfrak{g}}_1 \neq \dim D\bar{\mathfrak{g}}_3$, ни одна из пар 4.13.2 и 4.13.3 не эквивалентна тривиальной паре; подалгебры Леви алгебр 4.13.2 и 4.13.3 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ и $\mathfrak{su}(2)$ соответственно, следовательно, пары не эквивалентны), где

4.13.3	e_1	e_2	e_3	e_4	u_1	u_2	u_3
e_1	0	e_2	e_3	0	u_1	0	0
e_2	$-e_2$	0	0	e_3	0	u_1	0
e_3	$-e_3$	0	0	$-e_2$	0	0	u_1
e_4	0	$-e_3$	e_2	0	0	$-u_3$	u_2
u_1	$-u_1$	0	0	0	0	$-e_2$	$-e_3$
u_2	0	$-u_1$	0	u_3	e_2	0	$-e_4$
u_3	0	0	$-u_1$	$-u_2$	e_3	e_4	0

Связность на этой паре и ее тензор кручения также нулевые, тензор кривизны имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

алгебра голономии порождается лишь операторами кривизны (т. е. группа голономии совершенна) и имеет вид, приведенный в случае 4.13.2. Остальные случаи рассматриваются аналогично.

Заключение

С использованием системы аналитических вычислений получены новые результаты в теории инвариантных связностей на многообразиях, а именно, найдены трехмерные однородные пространства, допускающие аффинную связность с совершенной алгеброй голономии, что эквивалентно описанию соответствующих эффективных пар алгебр Ли. Описаны тензоры кривизны и кручения и сами совершенные алгебры голономии указанных связностей. Методика исследований ориентирована на использование средств компьютерной алгебры, теории групп и алгебр Ли, а также теории однородных пространств.

Литература

1. Кайгородов, В. Р. Полусимметрические лоренцевы пространства с совершенной группой голономии/ В. Р. Кайгородов // Гравитация и теория относительн. 1978. – № 14–15. – С. 113–120.
2. Можей, Н. П. Ненулевые алгебры голономии тривиальных связностей на однородных пространствах с неразрешимыми группами преобразований/ Н. П. Можей // Известия Гомельского государственного университета. 2018. – № 6 (111). – С. 81–88.
3. Wang, H. C. On invariant connections over a principal fibre bundle/ H. C. Wang // Nagoya Math. J. 1958. – № 13. – P. 1–19.